

ORIENTAÇÕES PARA Esvaziamento Gástrico (Sólido)

Avaliação da percentagem de retenção esofágica.

PREPARO

- **Jejum de 4 horas.**
- **Suspender medicações, se o médico solicitante pedir, tais como:** metoclopramida (Plasil, Plamet), tegaserod, eritromicina, domperidona, meperidina, codeína, morfina, oxicodona, cloridrato de diciclomina, fenobarbital, hiociamina, glicopirolato, por 24 horas antes do exame.
- **Pacientes que usam medicações de rotina, com exceção das acima citadas, deverão tomá-las pela manhã, ao levantar-se, com pequena quantidade de água.**
- Fumantes deverão suspender cigarros pela manhã e durante todo o exame.
- **O paciente deverá trazer: 2 ovos, 3 fatias de pão e 2 colheres de geleia de sua preferência.**

COMO É FEITO O EXAME?

- Será solicitado ao paciente o ovo e pão para o preparo do lanche.
- Uma vez preparado, o paciente será encaminhado à sala de exames e será orientado a ingerir toda a refeição.
- Após o término, o paciente será posicionado no aparelho e imagens serão adquiridas imediatamente, 1, 2 e 4 horas após a ingestão.
- Duração de cada aquisição: de 5 a 10 minutos.

Atenciosamente,

Responsável: Equipe Técnica ATOM