

ORIENTAÇÕES PARA TERAPIA COM XOFIGO (RADIUM 223)

Inicialmente, o paciente deverá marcar uma entrevista com um dos médicos de nossa equipe. No dia da entrevista, deve levar a cintilografia óssea ou PET-CT ósseo, exames laboratoriais, incluindo hemograma completo recente e pedido médico. O médico nuclear irá informar e orientar sobre o procedimento, além de esclarecer dúvidas pertinentes ao tratamento.

O regime de tratamento recomendado consta de 6 injeções endovenosas, administradas em intervalos de 4 semanas.

PREPARO

- Não é necessário jejum.
- Recomenda-se hidratação abundante prévia.
- Suspende 4 dias antes do tratamento: complementação com cálcio, bifosfonatos e vitamina D.

COMO É FEITA A TERAPIA?

- Ao chegar à clínica, o paciente será atendido por uma de nossas recepcionistas para a confecção da ficha cadastral.
- Em seguida será encaminhado à sala de injeção e uma veia periférica, preferencialmente do antebraço, será puncionada e mantida com soro fisiológico.
- O medicamento será então injetado na veia e o paciente deverá ser mantido com o soro fisiológico para hidratação.
- Após a hidratação, o paciente será liberado para voltar para casa.

ORIENTAÇÕES APÓS A TERAPIA

- O paciente será acompanhado pelo médico solicitante e pelo médico nuclear.
- Alguns raros casos de mielossupressão foram relatados e, por isso, a avaliação hematológica dos pacientes deve ser realizada no início do tratamento e antes de cada dose do Radium 223.
- Os pacientes tratados com quimioterapia prévia e que apresentam sinais de comprometimento da reserva da medula óssea devem ser tratados com precaução. As reações adversas mais frequentemente observada foram náuseas, vômitos, diarreia e trombocitopenia.
- Devido à excreção fecal do Xofigo®, os pacientes com doença inflamatória intestinal podem apresentar agravamento do processo inflamatório, sendo necessária avaliação cuidadosa nestes casos.

ORIENTAÇÕES APÓS TERAPIA COM XOFIGO (RADIUM 223)

Após a administração do Radiofármaco: manter distância por até 2 horas de crianças ou gestantes. Após esse período, não há restrições de contato.

Recomendação hidratação oral abundante.

Se, caso o paciente sentir algum sintoma de desidratação, hipovolemia, retenção urinária ou insuficiência renal, deve relatar ao médico oncologista e ao médico nuclear.

Manter boas práticas de higiene por pelo menos 1 semana após a administração do Xofigo, incluindo:

- **Ter cuidados especiais com sua excreção por uma semana após cada dose;**
- **Dar descarga no vaso sanitário várias vezes após o uso;**
- Lavar prontamente e de forma separada as roupas sujas.

Informar aos cuidadores a tomarem precauções universais, incluindo:

- Lavar sempre e muito bem as mãos após manipular o paciente;
- **Usar luvas e aventais quando manipular fluidos corporais.**

É recomendado uso de contracepção de barreira por seis meses após a dose e evitar gravidez em eventual parceira sexual por seis meses.

Se o paciente sofre de doença renal crônica, é recomendável que espere 24h após o tratamento com XOFIGO para realizar hemodiálise.

Agendar o retorno com o médico oncologista após a administração de cada dose de XOFIGO.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com um de nossos médicos.